

GENERATION[®] PAT'

EXTRÊMEMENT APPÉTENT

UNE SEULE INGESTION

FORTE INFESTATION



infestation

sachet de 10g



faible récurrente forte

RATS - SOURIS

PRODUIT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
DIFETHIALONE- 0,0025%



SEAU DE 5KG



Fabrication Française

LIPHATECH

GRUPP DE SANGOSSE

LES BONNES PRATIQUES D'UTILISATION DU GENERATION PAT[®]

Éliminer le plus possible les sources d'alimentation avant d'appliquer le produit.

Repérer les traces: crottes, nids, passages, coulés et trous formés par les rongeurs, pour disposer le produit au plus près de ces traces. Pour pouvoir identifier le rongeur parmi les 3 principales espèces (rat brun, surmulot, rat noir des greniers, souris domestique). Lire attentivement les recommandations d'usage citées ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES DU GENERATION PAT[®]

Formulation Pâte à base d'un anticoagulant de dernière génération: la DIFETHIALONE.

Le produit est destiné à être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles, contre les rats et les souris domestiques.

L'action du produit est observable dans les 3 à 14 jours suivant l'ingestion du produit par les rongeurs. Une prise unique et faible suffit pour que les rongeurs succombent.

Ce délai entre l'ingestion et la mort du rongeur est inhérent au mode d'action des anticoagulants. Il permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs qui continuent à consommer le produit.

COMMENT APPLIQUER GENERATION PAT[®] ?

Le produit doit être utilisé que dans des boîtes d'appâts sécurisées et étiquetées (étiquettes disponibles sur notre site internet WWW.LIPHATECH.FR). Le port des gants est obligatoire à chaque étape du traitement. Se laver les mains après toute utilisation/manipulation. Alternier les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition des phénomènes de résistance. Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison des méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène.

Vérifier l'efficacité du produit sur site: le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance. Ne pas utiliser le produit dans les zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis. Prévenir le responsable de la mise en marché en cas de non efficacité du traitement.

Disposer les sachets (10gr) dans des boîtes d'appâtage conformément au mode d'emploi ci-dessous. Ne pas ouvrir les sachets. Ne pas nettoyer les boîtes d'appâts entre 2 applications. Disposer les boîtes au plus près des traces des rongeurs de manière sûre afin de minimiser le risque de consommation par les animaux non cibles ou par les enfants. Placer les boîtes d'appâtage en zones non submersibles et à l'abri des intempéries. Ne pas disposer le produit sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Les boîtes d'appâtage ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que les rodenticides.

Le nombre de boîtes d'appâtage est fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre d'appâts disposés par boîte doit être adapté aux doses d'application recommandées et vous devez respecter les intervalles d'application du produit.

TABLEAU DES USAGES: UTILISATION À L'INTERIEUR ET AUTOUR DES BÂTIMENTS

Souris	Poser 3 à 5 sachets/boîte Faible infestation: Disposer une boîte tous les 2 à 3 mètres Forte infestation: Disposer une boîte tous les 1 à 1,5 mètres	À chaque contrôle, renouveler le remplissage des boîtes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle compléter chaque boîte jusqu'à 50g maximum.
Rats	Poser 10 à 20 sachets/boîte Faible infestation: Disposer une boîte tous les 8 à 10 mètres Forte infestation: Disposer une boîte tous les 4 à 5 mètres	À chaque contrôle, renouveler le remplissage des boîtes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle compléter chaque boîte jusqu'à 200g maximum.

FRÉQUENCE DE PASSAGE RECOMMANDÉE

Inspecter et réapprovisionner les postes d'appâtage quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé à titre indicatif, suivant l'infestation, la durée du traitement est de 2 à 5 semaines. Retirer tous les postes d'appâtage après la fin du traitement.

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

Stocker le produit à l'abri de la lumière. Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION

Déposer les boîtes d'appâtage usagées en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. Les appâts non consommés, non utilisés et entraînés hors des boîtes d'appâtage doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. L'emballage ne doit être réutilisé ou recyclé. Ne pas jeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. Ne se débarrasser de ce produit et de son emballage qu'en prenant toutes précautions d'usage.

PREMIERS SECOURS

Effets secondaires à l'ingestion: aucun dans l'immédiat, effet secondaire différé: perte de couleur des muqueuses (bouche, bord de l'œil).

En cas d'ingestion: se rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d'inhalation, respirer de l'air frais et se reposer. Si malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Indication pour le médecin: GENERATION PAT[®] contient un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la Vitamine K1 devrait être nécessaire pendant une longue période.

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le Centre Anti-Poisons le plus proche pour obtenir des conseils de traitement.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Nom homologué: GENERATION PAT[®]

AMM n° FR-2012-0511

Détenteur de l'homologation: LIPHATECH SAS - Bonnel - BP3 - 47480 PONT DU CASSE (FRANCE) -

Tél.: 05.53.69.35.70.

Composition: 0.0025% (m/m) de DIFETHIALONE (n° CAS 104653-34-1)

Formulation: Appât en pâte - prêt à l'emploi

Type de produit: TP14 Rodenticide

Catégorie d'utilisateur: Produit destiné à une utilisation par des Professionnels de la lutte contre les rongeurs.

Usages: Rats (*Rattus rattus* et *Rattus norvegicus*) - Souris domestiques (*Mus musculus*) du stade juvénile au stade adulte.

Dangereux pour les chiens et/ou chats

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'exposition répétée ou d'une exposition prolongée.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P102: Tenir hors de portées des enfants

P260: Ne pas respirer les poussières

P270: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation

P273: Éviter le rejet dans l'environnement

P280: Porter des gants de protection

P314: Consulter un médecin en cas de malaise

P501: Éliminer le contenu/le récipient selon la réglementation en vigueur



ATTENTION