

Produit biocide (TP18) contenant 0,05% m/m de fipronil (N° CAS : 120068-37-3).

Insecticide à usage professionnel, prêt à l'emploi, pour la lutte contre les blattes dans les domaines de l'hygiène publique

4 x 35 g

Autres conseils de prudence :

Conserver hors de portée des enfants

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Prévention :

P273 Eviter le rejet dans l'environnement

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SP1 - Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

**BASF Agro S.A.S. - 21, chemin de la Sauvegarde
F-69134 ECULLY Cédex - Tél. : 04 72 32 45 45**

Définition :

GOLIATH® Gel contient du fipronil. Cette substance active entraîne la mort des blattes en perturbant le fonctionnement du système nerveux (action sur les récepteurs canaux - GABA-A). Les blattes meurent quelques heures après une seule absorption de GOLIATH GEL. On trouvera des blattes mortes dans les lieux infestés 24 heures après le traitement.

GOLIATH® Gel est efficace contre les blattes germaniques (*Blattella germanica*), les blattes orientales (*Blatta orientalis*) et les blattes américaines (*Periplaneta americana*) aussi bien contre les nymphes que contre les adultes.

GOLIATH® Gel peut être utilisé contre les blattes dans :

- Les habitations (y compris les cuisines)
- Les bâtiments publics tels que les hôpitaux, les prisons, les théâtres, les hôtels, etc...
- Les locaux industriels et commerciaux tels que les usines, les magasins, les restaurants, et les cuisines commerciales, les ateliers, les cabines des avions, les véhicules, les trains et les bateaux.

Mode d'emploi :

Matériel :

Les cartouches de GOLIATH® Gel sont étudiées pour être utilisées avec le pistolet BaitGun®. Engager la cartouche de GOLIATH® Gel dans le pistolet BaitGun® et fixer l'embout approprié sur la cartouche. Se reporter aux instructions du fabricant pour les conditions d'utilisation du pistolet BaitGun®.

Inspection :

GOLIATH® Gel est plus efficace lorsqu'il est placé dans les lieux infestés par les blattes ou à proximité, dans les endroits où ils cherchent ou déposent de la nourriture. Ces lieux sont généralement sombres, chauds, humides et calmes, par exemple derrière les réfrigérateurs et dans les installations électriques. Il faut rechercher ces endroits par une inspection systématique ou mieux par piégeage.

Avant traitement :

On obtient de meilleurs résultats si la surface à traiter est préalablement rangée et si l'on prend la précaution d'éloigner toutes autres sources de nourriture.

Traitement :

Le GOLIATH® Gel doit être appliqué dans les endroits infestés sous forme de petites gouttes. Les gouttes de gel doivent être appliquées dans les crevasses sombres difficilement accessibles, les fissures, derrière les placards et les étagères, sous et dans les appareils ménagers des cuisines, dans les compteurs électriques, les vide-ordures, conduits et installations de la salle de bain, etc...

Gel, ni le poser sur des espaces déjà traités, ce qui pourrait diminuer l'attractivité du Gel.

Si le GOLIATH® Gel se répand sur des surfaces non destinées à être traitées, il conviendra de l'enlever avec une serviette en papier humide et de le jeter dans les ordures. Nettoyer à fond la surface à l'eau savonneuse..

Les blattes meurent quelques heures après une seule absorption de GOLIATH® Gel. On trouvera des blattes mortes dans les lieux infestés 24 heures après le traitement.

Après traitement :

Les surfaces traitées doivent être ré-inspectées après 1 à 2 semaines. En cas de forte infestation, une seconde application de GOLIATH® Gel pourra être nécessaire si le premier traitement a été consommé et que des blattes subsistent. En cas de ré-infestation renouveler le traitement.

Doses d'application :

En cas de forte infestation et dans les endroits particulièrement sales et/ou encombrés ou si on ne peut pas éloigner toutes autres sources de nourriture on doit utiliser la dose plus haute.

Dose normale :

Blatte germanique : une goutte de 0,03 g gel/m²

Blatte orientale ou américaine :	deux gouttes de 0,03 g gel/m ²
----------------------------------	---

Dose haute :

Blatte germanique : deux goutte de 0,03 g gel/m²

Blatte orientale ou américaine :	trois gouttes de 0,03 g gel/m ²
----------------------------------	--

Stockage et élimination :

Stocker les cartouches de GOLIATH® Gel dans la boîte d'origine à l'écart des grandes variations de température. Ne pas stocker en dessous de - 10°C, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Il est interdit de réutiliser les emballages vides.

Ne se débarrasser des emballages qu'en prenant toutes les précautions d'usage et en respectant la réglementation en vigueur.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer le GOLIATH® Gel à un endroit où il serait susceptible d'être inondé ou éliminé par le ménage.
- Ne pas pulvériser d'autres insecticides sur ou autour du GOLIATH®
- Ne pas essayer d'ouvrir les cartouches ou de les remplir à nouveau.
- Ne pas mettre de gel dans les endroits où la nourriture et l'eau pourraient être contaminées.
- A n'utiliser que dans des emplacements inaccessibles aux enfants et aux animaux.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison 01 40 05 48 48

En cas d'incident ou d'accident, appeler le 01 49 64 57 33

Fiches de Données de Sécurité sur www.basf-agro.fr

Produced on behalf of BASF Agro B. V.,
Arnhem (NL)- Wädenswil Branch
(P.O. Box 69, Moosacherstrasse 2, CH-8820 Wädenswil/AU).