

Couleur: CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

NE PAS REPROD

BAYER Maxforce QUANTUM

INSECTICIDE

Appât insecticide à base de spinosad
Contre les fourmis

UTILISATION EXCLUSIVEMENT
PROFSSIONNELLE

Contient:
0,2% de spinosad (p.p.p.e.)
Produit sous la marque Maxforce

4 x 30 g e

Bayer

<p>Caractéristiques :</p> <p>Maxforce® Quantum est gel appât prêt à l'emploi, à base d'imidaclopride pour un contrôle rapide des fourmis.</p> <p>Ce produit est particulièrement efficace contre la fourmi pharaon (<i>Monomorium pharaonis</i>) et la fourmi noire (<i>Lasius niger</i>). D'autres espèces de fourmis sont aussi contrôlées par ce produit : la fourmi harlequin (<i>Ruginosia melanocapitata</i>) et la fourmi argentine (<i>I. eximius</i> humilis).</p> <p>Cette formulation est un liquide visqueux. Elle contient 0,03% d'imidaclopride et un appât alimentaire d'une grande appétence pour les fourmis.</p> <p>Maxforce® Quantum est transparent et sans odeur, ce qui permettra une application discrète. Maxforce® Quantum contient un agent émulsifiant le "bitrex" pour éviter les ingestions accidentelles.</p> <p>Champs d'applications :</p> <p>Usage en intérieur et extérieur en hygiène publique et dans les locaux de stockage des denrées alimentaires.</p>	<p>Environnement domestique (cuisines incluses).</p> <p>Manipulation des aliments Fabrication : lieu de fabrication des aliments, cuisines, abattoirs, etc. Stockage : grande distribution, entrepôts, stockage de matières premières, sites d'exportation de produits etc. Préparation : restaurants, cuisines industrielles etc.</p> <p>Bâtiments publics Les bâtiments continuellement occupés tel que hôpitaux, hôtels, bars, restaurants, bâtiments municipaux, écoles, centres sociaux, cinémas etc.</p> <p>Extérieur Terrasses, trottoirs, parkings, zone d'entrées dans les abris et garages, etc. Ne doit pas être utilisé dans les sols, poteries et bacs à fleurs.</p> <p>Insectes visés :</p> <p>Fourmi pharaon (<i>Monomorium pharaonis</i>), fourmi noire (<i>Lasius niger</i>), fourmi harlequin (<i>Ruginosia melanocapitata</i>), fourmi argentine (<i>I. eximius</i> humilis).</p> <p>Matériel d'application :</p> <p>Les cartouches de Maxforce® Quantum permettent une application du produit en utilisant un pistolet applicateur. Si la cartouche n'a été que partiellement utilisée, retirez-la de l'applicateur, rebouchez avec l'emballage fourni et stockez-la comme indiqué.</p>	<p>Notes d'emploi :</p> <p>En préventif : Appliquez hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Pour une efficacité optimale, Maxforce® Quantum doit être appliqué sur le cheminement des fourmis. Répétez les zones à traiter en identifiant les zones infestées. Après traitement, la population de fourmi devrait être visible pendant 7 jours avec une baisse de fréquentation de la zone traitée. La plupart des colonies disparaîtront en moins de 14 jours. Lors d'infestations particulièrement importantes, une ré-injection est possible. Dans ce cas un contrôle doit être effectué jusqu'à 2 mois. Le point d'application doit être efficace pendant au moins 12 semaines. Tant que ces points seront présents, les réinfestations pourront être évitées.</p> <p>Intégration au traitement : Appliquez Maxforce® Quantum directement en gel dans les zones infestées. Informez les résidents d'éviter de nettoyer et d'élever les points d'appâtage. Si l'infestation est importante, il est recommandé de ré-inspecter les points d'appâtage régulièrement et de ré-appliquer du produit si nécessaire. Éviter les applications dans les zones excessivement poussiéreuses, humides, grasses ou qui sont soumises à un nettoyage fréquent. Ne pas appliquer directement sur les zones de préparation d'aliments ou les zones richement garnies avec un insecticide qui contiendrait l'appât.</p>	<p>Utilisation intérieure : Maxforce® Quantum peut être appliqué dans les fissures et anfractuosités (entre les briques d'un mur, aux jointures des trottoirs, etc.) où les fourmis ont été aperçues ou cheminant. Placez l'appât à l'abri de la pluie. Si la surface est exposée ne traitez que s'il n'y a pas de précipitations de plus dans les 24 heures. S'il pleut moins de 24 heures après traitement, ré-appliquez du produit. Si l'entrée du nid est visible, il est possible d'injecter le produit directement dans le tunnel d'entrée. Toujours reboucher le bouchon sur la cartouche après usage pour éviter la fuite du produit. Le matériel de protection doit être utilisé conformément aux instructions.</p> <p>Respect de la résistance : Non applicable puisque les ouvrières sont des femelles stériles.</p> <p>Dose d'application :</p> <p>Utilisation intérieure : Pour la fourmi pharaon et la fourmi harlequin : 1 goutte de 0,2 g environ 1 cm de diamètre par m² traité. Par exemple : traitement d'une cuisine de 10 m² avec 10 gouttes de 0,2 g chacune. Ou traitement d'une cuisine de 10 m² et d'une salle de bain de 10 m² avec 20 gouttes de 0,2 g chacune.</p>	<p>Pour la fourmi noire, une goutte de 0,2 g par mètre linéaire sur tout cheminement.</p> <p>Utilisation extérieure : Fourmis noires et autres espèces : pour traitement direct du nid, injection de 2 g de produit directement dans le tunnel d'entrée. Pour application sur les cheminements 0,2 g par mètre linéaire avec un maximum de 2 g par colonie.</p> <p>Précautions :</p> <p>Ne pas congeler (ne pas conserver à des températures inférieures à 0°C). Ne pas utiliser sur grill ou dans des stockages de grill. Ne pas remplir ni modifier les cartouches. L'emballage peut être aléatoire en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de cet emballage. Ne pas jeter ces résidus dans les égouts et les cours d'eau. N'appliquer le gel que dans les endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux. Après l'emploi de Maxforce® Quantum et avant les repas, se laver les mains et le visage avec de l'eau et du savon. Ne pas appliquer le gel sur les surfaces où les aliments sont conservés, préparés ou consommés.</p>
--	--	---	---	--